Interaktiver Patientenfall

KEYTRUDA®
Um die Chance auf Heilung zu verbessern.

KEYTRUDA® als adjuvante Monotherapie beim Melanom im Stadium IIB

KEYTRUDA® ist als Monotherapie zur adjuvanten Behandlung des Melanoms in den Tumorstadien IIB, IIC oder III nach vollständiger Resektion bei Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren und Erwachsenen angezeigt.

KEYTRUDA®
Pembrolizumab, MSD

EINSATZ VON KEYTRUDA® BEI EINEM PATIENTEN MIT EINEM MELANOM IM STADIUM IIB

Diese Patientenkasuistik dient als Beispiel und kann bei jedem Patienten individuell abweichen.

Patientenfall von Dr. med. Kai-Martin Thoms, Leiter des Hautkrebszentrums der Universitätsmedizin Göttingen

Anamnese

Patientenprofil:

- Patient, männlich, Landwirt
- 58 Jahre alt (* 1965)

Nebenerkrankungen:

- Keine relevanten Grunderkrankungen & keine Medikamenteneinnahme

Fiktives Patientenbild

Vorgeschichte:

11/2023: auswärts vollständig exzidiertes nävusassoziiertes malignes Melanom mit einer Tumordicke nach Breslow von 2,8 mm und Ulzeration (pT3b) am unteren Rücken

- Molekulargenetische Analyse: BRAF-V600E-Mutation

12/2023: Nachexzision mit einem Sicherheitsabstand von 2 cm sowie eine Sentinel-Lymphadenektomie rechts axillär

- kein Tumornachweis (0/2 SLN), kein Hinweis auf Metastasen
- **Staging: pT3bN0M0, entsprechend Stadium IIB nach AJCC 2017**[1]

Therapieverlauf der adjuvanten Therapie:

Empfehlung des Tumorboards zur adjuvanten Therapie mit einem PD-1-Inhibitor

02/2024: Einleitung der Therapie mit KEYTRUDA® mit 200 mg alle drei Wochen **(Q3W)***

04/2024: **Änderung** des Dosierungsintervalls zu 400 mg alle 6 Wochen **(Q6W)***

03/2025: **Planmäßige Beendigung der Therapie**

* Die empfohlene Dosis von KEYTRUDA® bei Erwachsenen beträgt entweder 200 mg alle 3 Wochen oder 400 mg alle 6 Wochen als intravenöse Gabe über 30 Minuten.

Bitte lesen Sie vor Verordnung die Fachinformation von KEYTRUDA®.
KEYTRUDA® ist am häufigsten mit immunvermittelten Nebenwirkungen assoziiert. Weitere Informationen zur Häufigkeit und Schwere entnehmen Sie bitte der Fachinformation KEYTRUDA®.

Dieser Patientenfall wurde zur Verfügung gestellt von
Dr. med. Kai-Martin Thoms
Leiter des Hautkrebszentrums der Universitätsmedizin Göttingen

Bei geeigneten Patienten im Stadium IIB kann eine adjuvante Therapie sinnvoll sein.

Die interaktive Kasuistik eines 58-jährigen Landwirts:
Klicken Sie sich von der Diagnose bis zur Nachsorge durch diesen realen Patientenfall.
Neugierig geworden? Schauen Sie jetzt rein unter *www.go.msd.com/kasuistik-adjuvant*

ABKÜRZUNGEN:
AJCC = American Joint Committee on Cancer | **Q3W** = alle 3 Wochen | **Q6W** = alle 6 Wochen

REFERENZEN:
1. Gershenwald et al. Melanoma staging: Evidence-based changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. CA Cancer J Clin. 2017 Nov;67(6):472–492.

Lesen Sie bitte vor Verordnung von KEYTRUDA® die Fachinformation!

MSD

MSD Sharp & Dohme GmbH | Levelingstr. 4a | 81673 München | www.msd.de
MSD MedInfo | Telefon: +49 89 20 300 4500 | E-Mail: medinfo@msd.de

Zur KEYTRUDA® Fachinformation

DE-OOC-00646