NEU

S3-Leitlinie
Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut

Version 2.0 – Dezember 2022
AWMF-Registernummer: 032/022OL

EVIDENZBASIERTE EMPFEHLUNG KLISYRI®:

Tirbanibulin 1% Salbe sollte für einzelne oder multiple aktinische Keratosen sowie bei Feldkanzerisierung angeboten werden.

5.6.6. Tirbanibulin

5.19	Evidenzbasierte Empfehlung	neu 2022
Empfehlungsgrad B	Tirbanibulin 1% Salbe sollte für einzelne oder multiple aktinische Keratosen sowie bei Feldkanzerisierung angeboten werden.	
Level of Evidence 2	[217] 2: De-novo-Recherche	
	Starker Konsens	

PRODUKTPROFIL KLISYRI®:

- **Anwendung: 1x täglich über 5 aufeinanderfolgende Tage**
- **Spezifischer Wirkmechanismus**
- **Günstiges Nebenwirkungsprofil**
- **Zulassung für Gesicht und Kapillitium***

*max. 25 cm^2

Die Originalfassung der S3-Leitlinie finden Sie hier

(https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/aktinische-keratose-und-plattenepithelkarzinom-der-haut/)

Das innovativste Produkt®

KLISYRI®
Tirbanibulin Salbe

DIE 5-TAGES THERAPIE GEGEN AKTINISCHE KERATOSEN[1,*]

STARK[2] UND SCHONEND[3]

SPEZIFISCHER WIRKMECHANISMUS[4]

STARKE WIRKSAMKEIT[2]

GUTES VERTRÄGLICHKEITS-PROFIL[3]

KURZE ANWENDUNGSDAUER[4]

* Feldtherapie nicht-hyperkeratotischer, nicht-hypertropher aktinischer Keratosen (Olsen-Grad I) im Gesicht oder auf der Kopfhaut bei Erwachsenen, Behandlungsareal: bis zu 25 cm²

REFERENZEN

1 Fachinformation Klisyri® (Stand Juli 2021): Klisyri ist angezeigt für die Feldtherapie nicht-hyperkeratotischer, nicht-hypertropher aktinischer Keratosen (Olsen-Grad I) im Gesicht oder auf der Kopfhaut bei Erwachsenen. **2** Fachinformation Klisyri® (Stand Juli 2021): Vollständige Abheilungsrate (Anteil der Patienten ohne klinisch sichtbare AK-Läsionen (null) im Behandlungsareal): 49%. **3** Fachinformation Klisyri® (Stand Juli 2021): Die meisten lokalen Hautreaktionen waren vorübergehend und leicht bis moderat ausgeprägt. **4** Fachinformation Klisyri® (Stand Juli 2021). **5** Gepoolte Daten, Grafik erstellt von Almirall auf Basis der Fachinformation für Klisyri®.

Klisyri 10 mg/g Salbe▼ Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: *Wirkstoff*: Ein Gramm Salbe enthält 10 mg Tirbanibulin. Jeder Beutel enthält 2,5 mg Tirbanibulin in 250 mg Salbe. ***Sonstige Bestandteile:*** Propylenglycol 890 mg/g, Glycerolmonostearat 40-55. **Anwendungsgebiete:** Feldtherapie im Gesicht oder auf der Kopfhaut erwachsener Patienten mit nicht-hyperkeratotischen, nicht-hypertrophen aktinischen Keratosen (Olsen-Grad I). **Schwangerschaft:** Die Anwendung von Tirbanibulin-Salbe während der Schwangerschaft und bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, wird nicht empfohlen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** ***Sehr häufig:*** an der Applikationsstelle: Erythem, Exfoliation (Schuppenbildung und Schuppung), Schorf (Verkrustung), Schwellung, Erosion (einschließlich Ulzeration). ***Häufig:*** an der Applikationsstelle: Schmerzen (umfasst Schmerzen, Druckschmerz, Stechen und Brennen), Pruritus, Bläschen (einschließlich Pusteln). **Stand der Information:** Juli 2021.**Almirall, S.A.**, Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spanien; Örtlicher Vertreter: **Almirall Hermal GmbH,** Scholtzstraße 3, 21465 Reinbek, Deutschland, www.almirall.de

DE-KLI-2200129

almirall
feel the science

almirallmed.de