


PATIENTENINFORMATION ZUR ANWENDUNG VON KLISYRI® IM SOMMER

Ihre Ärztin/Arzt hat Ihnen Klisyri® zur Behandlung Aktinischer Keratosen verschrieben. Bevor Sie mit der Anwendung des Arzneimittels beginnen, lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen.


Jede Packung Klisyri® enthält 5 Beutel zur Einmalanwendung an 5 aufeinanderfolgenden Tagen.



EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG VON KLISYRI® IN KOMBINATION MIT UV-SCHUTZPRÄPARATEN

- Aufgrund der Art der Erkrankung ist eine übermäßige Exposition gegenüber Sonnenlicht (einschließlich Höhensonne und Solarium) zu vermeiden oder zu minimieren.*
- Wie Sie sich insbesondere im Sommer vor schädlichem Sonnenlicht schützen können, erfahren auf der Rückseite unter „Tipps für den Umgang mit Sonne“.
- Die Therapie der AK mit Klisyri® ist grundsätzlich auch im Sommer in Kombination mit UV-Schutz (hoher Lichtschutz) und bei Meidung intensiver UV-Exposition möglich.
- Nach 8 Stunden Einwirkzeit von Klisyri® können UV-Schutzprodukte bzw. Kosmetika aufgetragen werden.

Sofern nicht anders verordnet, wäre ein mögliches Vorgehen, Klisyri® abends anzuwenden und UV-Schutzpräparate, bzw. Kosmetika morgens (nach 8 Stunden) aufzutragen.



*Hinweis laut Fachinformation



TIPPS FÜR DEN RICHTIGEN UMGANG MIT SONNE

- Im Freien sollte schützende Kleidung und eine Kopfbedeckung getragen werden sowie UV-Schutzmittel (hoher Lichtschutz, LSF 30+) angewendet werden.
- Verwendung von UV-Schutzpräparaten (LSF 30+) mind. 15 Min. vor UV-Exposition; Nachcremen, lichtdichte Kopfbedeckung und Sonnenbrille nicht vergessen.
- Auch an bewölkten Tagen kann Sonnenlicht die Haut schädigen.
- Insbesondere in der Zeit zwischen 10:00 und 16:00 auf direkte Sonnenbestrahlung verzichten.
- Die „Saison“ für Lichtschäden besteht besonders sonnenstandsbedingt von April bis Oktober.
- Kleidung nach dem UV-Standard 801 bietet einen besonders hohen UV-Lichtschutz.



Hier können Sie sich die detaillierte Anleitung zur Therapie mit Klisyri® auch als Video ansehen.



Wenden Sie Klisyri® immer genau nach den ärztlichen Anweisungen an. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.



Praxisstempel

Klisyri 10 mg/g Salbe ▼ Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: Wirkstoff: Ein Gramm Salbe enthält 10 mg Tirbanibulin. Jeder Beutel enthält 2,5 mg Tirbanibulin in 250 mg Salbe. **Sonstige Bestandteile:** Propylenglycol 890 mg/g, Glycerolmonostearat 40-55. **Anwendungsgebiete:** Feldtherapie im Gesicht oder auf der Kopfhaut erwachsener Patienten mit nicht-hyperkeratotischen, nicht-hypertrophen aktinischen Keratosen (Olsen-Grad I). **Schwangerschaft:** Die Anwendung von Tirbanibulin-Salbe während der Schwangerschaft und bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, wird nicht empfohlen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen: Sehr häufig:** an der Applikationsstelle: Erythem, Exfoliation (Schuppenbildung und Schuppung), Schorf (Verkrustung), Schwellung, Erosion (einschließlich Ulzeration). **Häufig:** an der Applikationsstelle: Schmerzen (umfasst Schmerzen, Druckschmerz, Stechen und Brennen), Pruritus, Bläschen (einschließlich Pusteln). **Stand der Information:** Januar 2022. **Almirall, S.A.**, Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spanien; **Örtlicher Vertreter: Almirall Hermal GmbH**, Scholtzstraße 3, 21465 Reinbek, Deutschland, www.almirall.de